

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

## ÉDITION DE LA STATION DE L'ILE DE FRANCE

(SEINE, SEINE & OISE, SEINE & MARNE, EURE-&-LOIR, EURE, OISE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 31, quai Voltaire, PARIS-7<sup>e</sup> - BAB. 48-38  
C. C. P. PARIS 9063-96

ABONNEMENT ANNUEL

12 NF

Bulletin N° 22

3 Juillet 1962

Délais d'emploi de différents insecticides avant  
la récolte de produits végétaux destinés à l'alimentation

### A/ Hydrocarbures chlorés

- Aldrine - Dieldrine	30 jours
- Toxaphène - Heptachlore	21 "
- D.D.T. - H.C.H. - Lindane - Chlorthiepin	15 "
- D.D.D. - Méthoxychlor	7 "

### B/ Esters Phosphoriques

- Parathion - Parathion méthyle - Diazinon - E.P.N. - Azinphos - Chlorthion - Isochlorthion - Dioxathion Diethion - Mercaptophos - Phenkapton - Carbophenothion Triméthoate	( 15 "
- Malathion - Trichlorfon	7 "

### C/ Insecticides systémiques

- Vamidothion	30 "
- Déméton méthyle - Déméton méthyle i - Endothion - Phosphamidon	21 "
- Morphothion - Azidithion	15 "
- Mévinphos - Diméthoate	7 "

### D/ Insecticides spécifiques

- Dapacryl	21 "
- Isolan - Dichlorophenyltrichlorethanol	15 "
- Chlorobenzilate - Chloropropilate - Chlorfénizon ou PCPPCBS - Fenizon ou PCPBS - Chlorbenside - Tétradifon	7 "

### E/ Produits divers

- Sevin	7 "
- Nicotine	10 "

NOTA : Sont interdits sur cultures maraîchères les produits suivants : Aldrine -  
Dieldrine et tous les systémiques à l'exception du Mévinphos.

743

**AVERTISSEMENTS****CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES****CULTURES FRUITIERES**

Dans la majorité des secteurs, les sorties les plus importantes se sont produites dans la période du 20 au 25 juin. Actuellement, elles continuent, quoique nettement plus faibles. La lutte doit donc être poursuivie.

En conséquence, un traitement devra être appliqué :

- Vergers traités du 22 au 25 juin, dès réception du présent avis;
- Vergers traités du 26 au 28 juin, du 6 au 8 juillet inclus.

NOTA : Dans la région du Neubourg, les premières sorties de papillons se sont produites depuis les environs du 25 juin. Il est encore trop tôt pour intervenir.

**TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER**

Des projections d'ascospores, de faible importance, peuvent encore avoir lieu. Il est prudent, surtout dans les régions où cette maladie sévit habituellement, d'ajouter un fongicide approprié, lors du traitement contre le Carpocapse. Cette mesure est indispensable dans le cas où les arbres sont actuellement touchés par la Tavelure.

**INFORMATIONS****PSYLLES - PUCERONS**

Dans la plupart des vergers grosse activité des pucerons. Attaques locales de Psylles. Si nécessaire profiter du traitement Carpocapse pour intervenir.

**MILDIOU - OIDIUM**

La lutte doit être maintenue.

**V I G N E****MILDIOU**

Aucun traitement ne se justifie dans l'immédiat. La surveillance des cultures reste valable en particulier dans les zones ayant reçu des pluies orageuses notables.

**POMMES DE TERRE****CULTURES MARAICHERES****MOUCHE DU CHOU**

La deuxième génération est généralement moins dangereuse que la première. Il est possible de protéger les choux soit par trempage des plants, soit par arrosage des pieds .

**TEIGNE DU POIREAU**

En élevage les sorties se poursuivent.

L'Ingénieur et l'Agent technique  
chargés des Avertissements Agricoles,  
H. SIMON et R. MERLING.

L'Inspecteur  
de la Protection des Végétaux,  
G. BERGER.

Note précédente : Supplément n° 1 - 21 juin 1962

Imprimerie de la Station de l'Ile-de-France - Directeur-Gérant : L. Bouyx.  
31, Quai Voltaire - Paris 7e.